

闲散地变身微田园，人居环境大变样 清河镇乡村振兴有妙招

□本报记者 海涛 报道
通讯员 范悦 李涵

清河讯 近日，记者走进清河镇杜家桥自然村，映入眼帘的是一排排栅栏围出的小田园。这里原本是一片破败烂瓦，现在里面种上了核桃树，一眼望去，干净美观又生机勃勃。

连日来，清河镇以改善人居环境为抓手，通过“靓面子”

“量里子”“强底子”，内外兼修推进农村人居环境整治工作，村庄人居环境和群众精神风貌得到显著提升。

“现在收拾好了，干净了，也种上核桃树了。”清河镇杜家桥自然村村民纷纷说道。

今年以来，杜家桥自然村整理房前屋后闲散地块72处，栽植核桃树2050棵。如今，错落有致的房屋，整洁有序的环境，

生机盎然的“微田园”已成为这个村一道亮丽的风景线。

“改善村容村貌工作作为一项重要的工作，经过前期党支部号召动员，党员带头推进，群众大力支持，村庄人居环境得到了很大的改善，群众获得了一个更加干净、宜居的生产生活环境。”镇财政所派驻清河镇杜家桥自然村第一书记高建斌说。

2020年以来，清河镇深入开

展以清乱堆乱放、清残垣断壁、清家禽散养、清乱涂乱贴等为内容的“四清行动”。随着工作的不断推进，清河镇共拆除残垣断壁、废旧房屋41471.8平方米，筹划打造了18350平方米的“微田园”，种植核桃树8025棵。并采取统一规划、统一栽植、群众自愿申请认领的方式，在绿化环境的同时有效增加了集体收入。

“今年以来，清河镇以开展

我垣断壁清零行动为契机，瞄准一镇一品，一街一景，选取了绿化效果好、成活率高且能带来收益的核桃树为我们的主打树种，目前，已栽植核桃树苗1万余棵，打造微田园近200处，既美化了城乡环境，又趟出了一条集体、农户双增收的路子。”清河镇党委副书记韩晓军说。

我县组织收看全市 一季度经济运行分析 暨重大项目推进会议

□本报记者 江梅君 报道
本报讯 4月28日，全市一季度经济运行分析暨重大项目推进会议举行。县领导殷梅英、刘卫忠、李宁波、李勇等在我县分会场收听收看会议。

会议要求，要按照党中央的决策部署和省委要求，坚持底线思维、常态化应对，牢牢把握目标导向“破常规”、落实导向“强调度”、问题导向“补短板”、绩效导向“在状态”，

进一步明确奋斗目标、掌握科学方法。要在认知领域和实践层面打通七个路径，即在常态化疫情防控和统筹推进上打通路径，在经济运行稳步提升上打通路径，在科技创新驱动上打通路径，在招商引资量质齐升上打通路径，在激活有效投资上打通路径，在民生短板强补上打通路径，在改革攻坚关键成效上打通路径，推动经济社会秩序全面恢复。

高质量打赢 脱贫攻坚收官战

□本报记者 江梅君 报道
本报讯 4月28日，全市抓党建促决战决胜脱贫攻坚暨扶贫领域问题整改推进视频会议召开。县委副书记李宁波就我县抓党建促脱贫、自查评估和问题排查整改、解决相对贫困试点探索等重点问题作交流发言。县委常委、组织部长王斌，县委副书记王翠兰在我县分会场收看会议。

全市会议后，李宁波强调，各级各部门主要负责人要强化第一责任人意识，对扶贫工作实行周调度制度，挂图推进。所有县级领导、县直部门主要负责人要走访所有享受政策贫困户及边缘群体，3702名帮扶责任人于5月10日前遍访贫困户，再次对贫困户进行脱贫成效评估。

基层党组织要通过建立扶贫理事会、组建党员扶贫志愿队、设立邻里互助岗等方面发挥示范引领作用，为脱贫攻坚筑牢坚实基础。

李宁波要求，各部门要在前期自查评估的基础上，集中开展“回头看、回头查”活动。相应责任部门要建立台账，对反馈问题逐一分析核实，尽快将问题销号清零。领导小组要做好协调抓总工作，实行周调度制度，对整改不力、进展缓慢的要进行约谈督办。要高度重视扶贫工作宣传，讲好惠民扶贫故事。全县上下要拿出硬碰硬的决心，以决战决胜之势全力冲刺攻坚，圆满完成各项验收任务，高质量打赢脱贫攻坚收官战。

政务快递

◆省农业科学院生物技术研究中心王兴军来我县调研农业生产工作，先后到惠民县荣润农业科技有限公司刘冲环村种植基地、惠民县远志中药材种植专业合作社、山东鑫源现代农业科技示范园、惠民县现代农业产业园实地查看。县人大常委会副主任周增宝参加调研。

通过调研，王兴军认为我县农业资源丰富，农产品种类多，希望我县进一步加强农业基础设施配套和标准化生产，改进运营模式，强化合作社示范带动能力，加强对种植户的技术培训，加快农产品区域公共品牌建设，形成明显的产业特色，进一步提高产品综合竞争力。

(周洋)

◆4月28日，全市2020年春季学期学生复学工作调度

视频会议召开，副县长王春平在我县分会场收看会议。

全市会议后，就我县学生复学工作，会议要求，相关部门要高度重视复学工作，强化风险意识，保持高度警惕，始终把师生生命安全和身体健康放在第一位。要措施到位，细化完善方案、抓好培训演练、抓好重点防控，建立协同高效的联动机制，压实学校主体责任。要立足于实际，构建起严密防控网络，确保每名学生的生命健康。各部门要精诚协作，提高应急处置能力，加强沟通协调，全面统筹，形成强大的工作合力，做好、做细各项工作，确保我县复学工作安全顺利有序推进。同时，要加大宣传力度，增强社会协同意识，强化家庭教育引导，为学生复学提供坚强保障。

(刘元元)

◆平安行 你我他 惠民交巡警专项整治酒驾行为

□本报记者 郝海涛 报道
通讯员 赵文特 付孝晶

本报讯 近日，县公安局交巡警大队结合辖区道路实际，开展酒后驾驶专项整治行动，深入推进酒驾整治常态化，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

行动中，县交巡警大队制定“点、线、面”相结合的巡查查控模式，加大巡查密度，将酒后驾车行为消除在萌芽阶段。对经过卡点的车辆做到逢车必检、逢疑必测，对酒后驾车违法行为发现一起、查处一起，实行“零”容忍，切实形成整治酒驾严查、严管的高压态势。

此次行动共检查各类机动车240余辆，共查处酒后驾驶违法行为6起，无证驾驶违法行为4起，有力打击了酒驾违法行为，消除了交通事故安全隐患。

何坊街道 文明实践入民心

□通讯员 王晚斐 报道
通讯员 范悦 李涵

何坊讯 4月29日，何坊街道举办新时代文明实践志愿服务大集活动。活动中，新时代文明实践志愿者们来到集市，通过悬挂条幅、发放宣传册、现场解答等方式，从健康保健知识、移风易俗、法律服务、安全用火等多方面进行主题宣传，并为群众提供民生政策咨询志愿服务。

本次志愿服务大集活动，共悬挂横幅16条，发放主题宣传材料800余份，为群众提供了形式多样的志愿服务项目，满足了群众的多种需求。同时，活动还动员更多热心公益的志愿服务队伍加入到新时代文明实践中来，弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，为新时代文明实践工作注入新的活力。

◆健康知识

新型冠状病毒肺炎

新型冠状病毒肺炎是以以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株。可导致新型冠状病毒肺炎。

传播途径：新型冠状病毒主要的传播途径有三种：飞沫传播是主要的传播途径，新型冠状病毒患者打喷嚏、咳嗽时喷出的飞沫中都会含有这种病毒，如果此时与患者距离较近，自己没有做好防护措施，吸入了含有病毒的飞沫，就可能会被感染疾病。密切接触也是这种病毒的传播方式，另外新型冠状病毒还会通过粪-口传播。

主要症状：感染病毒的人会出现程度不同的症状，有的只是发烧或轻微咳嗽，有的会发展为肺炎，有的则更为严重甚至死亡。

易感人群：各个年龄段的人都可能被感染，被感染的主要是成年人，其中老年人和体弱多病的人更容易被感染，另外儿童和孕产妇也是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群。

预防措施：避免前往人群密集的公共场所，避免接触发热呼吸道感染者，如接触时要佩戴口罩；勤洗手，尤其在接触呼吸道分泌物污染时、触摸过公共设施后、照顾发热呼吸道感染或呕吐腹泻病人后、探访医院后、处理被污染的物品以及接触动物、动物饲料或动物粪便后；不

要随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖肘遮住口、鼻；加强锻炼，规律作息，保持室内空气流通；避免接触禽畜、野生动物及其排泄物和分泌物，避免食用野生动物和野生动物，避免食用野生动物；杜绝带病上班、聚会。

麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身性出疹性疾病。其主要危害是肺炎、中耳炎、喉气管炎、支气管炎、脑炎和脑膜炎等并发症，特别是当伴有营养不良时，常常因并发症引起死亡，病死率高达10%。

传播途径：主要通过呼吸道传播，传染性要超过甲流。

主要症状：麻疹发病早期症状和普通感冒相似，有的口腔黏膜有红疹的灰白小点（柯氏斑），随后皮肤开始出现密密麻麻的红色斑丘疹。

易感人群：各个年龄段的人都可能被感染，其中老年人和体弱多病的人更容易被感染。

预防措施：预防麻疹最有效的方法是接种含麻疹疫苗。目前我省执行3剂次免疫程序，即8月龄接种麻疹疫苗，1岁半接种麻疹疫苗，6岁接种麻疹疫苗。平时应养成良好的个人卫生习惯，经常开窗通风换气，保持室内空气清新、流通。周围有人得了麻疹，应做好隔离，避免与其密切接触，若自身麻疹疫苗接种史不详，应到有关单位进行应急接种，以防被传染。

其密切接触，若自身麻疹疫苗接种史不详，应到有关单位进行应急接种，以防被传染。

风疹

风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病，儿童常见，成人也可发病。

传播途径：风疹病毒经呼吸道侵入，潜伏期12—14天。

主要症状：临床以发热、皮疹及耳后、枕下及颈部淋巴结肿大和疼痛为特征，也有些病例不表现发热和皮疹，一般对患者本身危害不大。

易感人群：风疹的主要危害在于怀孕3个月以内的孕妇如果感染风疹，不论是显性感染还是隐性感染，均有可能使胎儿受感染，导致流产或先天性风疹综合征（CRS），造成胎儿耳聋、视网膜病变、智能障碍、畸形、心脏疾病等问题。

预防措施：预防风疹最有效的方法是接种含风疹疫苗。目前我省执行3剂次免疫程序，即8月龄接种麻疹疫苗，1岁半接种麻疹疫苗，6岁接种麻疹疫苗。平时应养成良好的个人卫生习惯，经常开窗通风换气，保持室内空气清新、流通。周围有人得了风疹，应做好隔离，避免与其密切接触，若自身麻疹疫苗接种史不详，应到有关单位进行应急接种，以防被传染。

收，村里租赁了机器和车辆帮助群众清理或移栽地表树木，并积极联系村里苗木经营户，优先收购这些清理树木，尽量避免群众的损失。

后找李党支部书记张军告诉笔者，清理后的土地计划建设套

的园、露天采摘园、果蔬采摘大棚和果蔬套袋园四个园区，在增加村集体收入的同时，改善村民的生活环境和生活质量。

钩园、露天采摘园、果蔬采摘大

唤醒沉睡资源 激活乡村经济

□通讯员 申建强 报道

连日来，老户李镇后找李村大力开展闲散土地回收工作，让荒废多年的土地焕发新机。

“这么多年了，破场院、烂田地虽然种上了树，但经过十几年才长了5、6公分，而且树干

不直，树形也不好，根本没有收入，这次村里决定收回统一管理，老百姓都很支持，这样不仅可以增加村集体收入，而且村民也可以入股，得到一定的收益。”

后找李自然村村民李再说道。

据悉，为尽快实现土地回

春夏季常见呼吸道传染病预防知识

流行性腮腺炎

俗称“痄腮”，是由腮腺炎病毒引起的以腮腺肿大为特征的急性传染病，是脑炎、脑膜炎常见的致病因子，亦是儿童后天获得性耳聋最常见的原因。

传播途径：主要通过呼吸道飞沫进入人体。

主要症状：患者大多无前期症状，而以耳下部肿大为首发表现，少数病例可有短暂非特异性不适（数小时至2天），可出现肌肉酸痛、食欲不振、倦怠、头痛、低热、结膜炎、咽炎等症状。

易感人群：发病年龄上多见于儿童，5—14岁儿童发病最高，成年发病多在青春期。

预防措施：预防流行性腮腺炎最有效的方法是接种含腮腺炎疫苗。目前我省执行2剂次免疫程序，即1岁半接种麻疹疫苗，6岁接种麻疹疫苗。平时应养成良好的个人卫生习惯，经常开窗通风换气，保持室内空气清新、流通。周围有人得了腮腺炎，应做好隔离，避免与其密切接触，若自身腮腺炎疫苗接种史不详，应到有关单位进行应急接种，以防被传染。

结核病

结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病，可侵及许多脏

器，以肺部结核感染最为常见。

传播途径：人与人之间呼吸传播是本病传染的主要方式。排菌者为最重要的传染源。

主要症状：侵入不同部位表现不一。肺结核早期或轻度肺结核，可无任何症状或症状轻微而被忽视，若病变处于活动进展阶段时，可出现午后体温升高，一般为37—38℃之间，患者常伴有全身乏力或消瘦，夜间盗汗，女性可导致月经不规律或停经。

易感人群：各个年龄段的人都可能被感染，其中老年人和体弱多病的人更容易被感染。

预防措施：日常生活中保持良好的健康生活习惯、增强体育锻炼、提高免疫力。在家中注意通风，保持卫生，避免与结核患者密切接触。接种卡介苗可预防儿童患上严重的结核病。

流行性感冒

流行性感冒简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，具有很强的传染性。流感病毒分为甲、乙、丙三型。

传播途径：以空气飞沫传播为主，也可通过被病毒污染的物品间接传播。

主要症状：有发热、全身酸痛、咽痛、咳嗽等症状。

易感人群：人群对流感普遍易感，病后有一定免疫力，但维持的时间不长，病毒不断发生

变异，可引起反复感染发病。

预防措施：接种流感疫苗已被国际医学界公认是防范流感的最有效的武器。由于流感病毒变异很快，通常每年的流行类型都有所不同。因此，每年接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。另外，锻炼身体，增强体质，在流感季节经常开窗通风，保持室内空气新鲜，老年人、儿童尽量少去人群密集的地方等等，也是预防流感的有效措施。

水痘

水痘是由水痘一带状疱疹病毒引起的急性呼吸道传染病。

传播途径：具有高度传染性，病毒主要通过人与人之间直接接触或飞沫（如咳嗽、打喷嚏等）传播，也可以通过接触病人的疱疹液或被污染的用具传播。

主要症状：发病初期会出现发热、头痛、咽痛等上呼吸道感染症状，之后便很快出现皮疹。皮疹通常首先在头部、躯干出现，逐渐蔓延到面部及四肢。皮疹初起为红色斑疹伴痒感，有小米粒到绿豆粒大；进而形成水疱，呈椭圆形，大小不一，一般如绿豆粒大，四周发红；水疱数小时后可变混浊，容易破溃；约1天后开始结痂；再过1周左右，痂皮脱落。病程一般为5—10天。

易感人群：人类对水痘一带状疱疹病毒普遍易感。易感者在室内环境持续暴露于水痘后，几乎均可受染。故水痘往往在托幼机构、小学，或儿童的其他集中场所内形成流行。

预防措施：有效手段是及时接种水痘疫苗，凡没有患过水痘也未接种过水痘疫苗的儿童，都可以通过接种疫苗来预防水痘。

猩红热

猩红热是由A群溶血性链球菌感染引起的急性呼吸道传染病。

传播途径：传染源是患者和健康带菌者，主要通过空气飞沫传播。

主要症状：发热、咽峡炎、全身弥漫性鲜红色皮疹和疹后脱屑。少数患者患病后由于变态反应而出现心、肾、关节的损害。

易感人群：发病年龄以3—8岁小儿为主，6个月以内婴儿因从母体获得被动免疫力，故很少发病。由于易感人群较为集中，猩红热疫情多发生在托幼机构和小学。

预防措施：猩红热目前尚无疫苗可预防，主要预防措施为加强通风换气，保持室内空气新鲜；在本病流行期间，勿带儿童出入公共场所；对病人隔离治疗。